

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGÓW LASEROWYCH:

- Spożywanie **zioł fotouczulających** (dziurawiec, nagietek, mieszanki ziołowe np. Skrzypovita, Figura itp. – należy zakończyć stosowanie 2 tygodnie przed zabiegiem)
- Świeża **opalenizna** (również solarium – 1-2 tygodnie przed zabiegiem)
- Balsamy **samoopalające i brązujące** (2 tygodnie przed zabiegiem)
- **Kremy** z witaminą A i C oraz kremy z kwasami i substancjami ziołowymi np: krem z nagietkiem, maści sterydowe, maści antybiotykowe. (należy zakończyć kurację 3 tygodnie przed zabiegiem)
- Aktywne zmiany **wirusowe i bakteryjne** na skórze objętej zabiegiem
- **Depilacja** woskiem lub pęsetą (4 tygodnie przed zabiegiem)
- Guzy i **nowotwory** (przebyty rak skóry, czerniak złośliwy)
- Bielactwo, łuszczyca oraz inne **choroby autoimmunologiczne**
- Ciąża, karmienie piersią
- Rozrusznik serca, implanty, pompa insulinowa
- Tendencja do powstawania **bliznowców i keloidów**
- **Cukrzyca** nieuregulowana
- **Epilepsja**
- Zaburzenia **krzepnięcia** krwi
- Stosowanie leków **obniżających krzepliwość** krwi
- **Przyjmowanie leków światłoczułych (np. Tetracykliny)**
 - **antybiotyki** (np: tetracykliny, azytromycyna, ciprofloksacyna, kotrymoksazol, nitrofurantoina, doksycyklina, metronidazol)
 - leki **homeopatyczne**, steroidowe,
 - niektóre leki przeciwnadciśnieniowe, **nasercowe** (amilorid, amiodaron, atenolol, bisoprolol, kaptopryl, diltiazem, enalapryl, enarenal;
 - niektóre leki **przeciwcukrzycowe**, np. tolbutamid, glipizyd, metformina
 - sulfonamidy;
 - tiazydowe środki **moczopędne**: hydrochlorotiazyd, bendroflumentiazyd, bemetizyd
 - środki **przeciwbólowe** (ketonal, ibum, ibuprofen, polopiryna, aspiryna, pyralginum i inne (można tylko paracetamol, Apap)
 - niesteroidowe środki **przeciwreumatyczne**;
 - niektóre środki **przeciwbakteryjne i** przeciwgrzybiczne (terbinafina, ketokonazol, gryzeofulwina)
 - niektóre środki uspokajające i **przeciwdepresyjne**, a także przeciwwymiotne (np. fenotiazyny);
 - pochodne **retinoidów** zarówno te zawarte w lekach doustnych, jak i w maściach;
 - leki **przeciw Pasożytnicze** (chinina, chinidyna, chlorochina)
 - szczepionki np. przeciw grypowe do 2 tyg. przed zabiegiem
 - Przyjmowanie **Roaccutanu, Accutanu, tretinoiny, izotretinoiny** (6 miesięcy po zakończeniu terapii można wykonać zabieg laserowy)